Allegato n° 3 della Direttiva Regionale
Assessorato Della Salute
Regione Siciliana

Percorso A

Pronto Soccorso

Paziente Sintomatico per Sindrome Influenzale al Pronto Soccorso

TRIAGE SEPARATO IN LOCALI DEDICATI, BOX O TENDA ADIACENTE DEDICATA

A rischio per esposizione nCoV-19?

- Regioni a rischio per presenza di casi primitivi o secondari
- Precedente contatto stretto* con caso probabile o confermato affetto da nCoV-19
- Frequentazione professionale o meno di Ospedale dove si trattano Pz affetti da nCoV-19

SI → **NO** → Assistenza Standard

Sono Trascorsi meno di 14 giorni fra l'esposizione a rischio per nCoV-19 e l'inizio dei sintomi?

SI → **NO** → Assistenza Standard

Immediata Implementazione **Misure IPC** (Infection Prevention & Control)
Paziente:
Immediato **isolamento** del paziente
Mascherina chirurgica al paziente (se tollerata)
Operatori Sanitari:
filtranti respiratori **FFP2** (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol)
protezione facciale
camice impermeabile a maniche lunghe
doppi **guanti** monouso non sterili

Vestizione: Regole Comportamentali
Togliere ogni monile o oggetto personale e praticare accurata igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica
Controllare l'integrità dei dispositivi
Indossare il primo paio di guanti
Indossare il camice monouso sopra la divisa
Indossare idoneo filtro filtrante facciale (FFP2)
Indossare occhiali di protezione
Indossare il secondo paio di guanti

Supporto Precoce e Monitoraggio
Somministrazione **O2** con materiale monouso partendo da 5 L/min fino ad ottenere SatO2 > 90%
Fluidoterapia di mantenimento se non segni di shock (Lac > 2 mmol/L)
Prelievi per colture batteriche e materiale per indagini virali**
AntibioticoTerapia empirica ragionata ad ampio spettro
Monitoraggio continuo della **pulsiossimetria**

Svestizione: Regole Comportamentali
Evitare qualsiasi contatto tra DPI e viso, mucose o cute
I DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore nell'area di svestizione
Decontaminare i DPI riutilizzabili
Rispettare la sequenza indicata:
- Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore
- Rimuovere il primordio di guati e smaltirlo nel contenitore
- Rimuovere gli occhiali e sanificarli
- Rimuovere la maschera FFP2 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore
- Rimuovere il secondo paio di guanti
- Praticare l'igiene delle mani con soluzione alcolica o con acqua e sapone

Il Presente Modello deve essere recepito e contestualizzato nel Modello Organizzativo di ciascuna Azienda Ospedaliera

Il Paziente ha una Infezione Acuta Respiratoria (ARI) che necessita l'ospedalizzazione?

SI

Il Paziente mantiene una SatO2 > 90% ed una FR < 35 atti/min con ossigenoterapia in maschera e/o NON ha segni di Shock (Lac > 4 mmol/L)

SI

Trasferimento presso Malattie Infettive del DEA di Riferimento Territoriale (vedi Dir Reg. n° 3257 del 20/01/2020)
Stanze di **isolamento** (possibilmente singole) a pressione negativa, bagno dedicato e possibilmente anticamera (filtro)
Utilizzo di **ABZ** fornita di divisione tra vano autista e vano paziente che sarà **decontaminata*** ** immediatamente dopo il trasferimento
ABZ Fornita dalla stessa Azienda per il trasporto interno (**Intra**Ospedaliero)
ABZ Fornita dalla CO 118 di riferimento per il trasporto esterno (**Inter**Ospedaliero)

NO

Consulenza Rianimatoria! - Inizia Percorso B