



Sostanze attive autorizzate per l'impiego in agricoltura:



CETRIOLO

Aggiornamento al 16 novembre 2020

Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso	Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso
Abamectina (1)	acar./insett./nem.	3	0,04	C	Fluopyram	fungic./nemat.	3	0,5	C
Acetamiprid (2)	insetticida	7°/3°	0,3	C	Flupyradifurone	insetticida	3	0,6	C
Acibenzolar-S-methyl	attivatore difesa	14	0,4	C	Fluxapyroxad	fungicida	3	0,2	C
Acido pelargonico	diserbante	-		C	Fosetil alluminio (6) (7)	fungicida	3	80	C
Acrinatrina	acar./insett.	-	0,02*	C	Fosfato ferrico (3) bio	limacida	-		C
Alfa-cipermetrina	insetticida	3	0,2	C	Glifosate	diserbante	-	0,1*	T.a.c.
Ametoctradin	fungicida	1	2	C	Helicoverpa armigera nucleopoliedrovirus bio	insetticida	3		C
Ampelomices quisqualis bio	fungicida	-	-**	C	Imidacloprid (8)	insetticida	3	1	C
Azadiractina (3) bio	insetticida	3	1	C	Indoxacarb	insetticida	3	0,5	C
Azoxystrobin	fungicida	3	1	C	Isopirazam	fungicida	1	0,4	C
Bacillus amyloliquefaciens FZB 24 bio	fungicida	0	-**	C	Kresoxim-metile	fungicida	3	0,05*	C
Bacillus amyloliquefaciens sbs plantarum bio	fungicida	-	-**	C	Lambda-cialotrina (2)	insetticida	3	0,05	C
Bacillus pumilis QST 2808 bio	fungicida	-		C	Lecanicillium muscarium (9) bio	insetticida	3		C
Bacillus subtilis bio	fungicida	-		C	Lufenuron	insetticida	7	0,15	C
Bacillus T. sub. Aizawai (3) bio	insetticida	3	-**	C	Maltodestrina	acar./insett.	-		C
Bacillus T. sub. Kurstaki (3) bio	insetticida	3	-**	C	Mancozeb	fungicida	3	2	C
Beauveria bassiana bio	acar./insett.	-	-**	C	Meptyldinocap	fungicida	3	0,1	C
Beta-ciflutrin	insetticida	3	0,1	C					
Bicarbonato di potassio bio	fungic./insett.	1		C	Metalaxil- M (3)	fungicida	14	0,5	C
Bifenazato	acaricida	3	0,5	C	Metaldeide (3)	limacida	20	0,05*	C
Boscalid	fungicida	3	4	C	Metam-potassio	dis./fung./ins./nem.	-	0,02*	T.a.c.
Bupirimate	fungicida	1	1	C	Metam-sodium	dis./fung./ins./nem.	-	0,02*	T.a.c.
5-nitroguaiacolato di sodio	fitoregolatore	3	0,03*	C	Metarhizium anisopliae var. anisopliae bio	acar./insett.	-		C
Cerevisane bio	induttore di resist.	-		C	Metiram	fungicida	3	2	C
Ciflufenamid	fungicida	1	0,05	C	Metrafenone	fungicida	3	0,5	C
Cimoxanil	fungicida	3	0,08	C	Miclobutanil	fungicida	3	0,2	C
Cipermetrina	insetticida	-	0,2	C	NAD	fitoregolatore	7	0,06*	C
Ciromazina (4)	insetticida	3	2	C	O-nitrofelato di sodio	fitoregolatore	3	0,03*	C
Clofentezine	acaricida	3	0,2	C	Olio di arancio bio	acaric./fung./insett.	3		
Clorantprilipolo	insetticida	3	0,3	C	Olio di colza	acar./coadiuv./insett.	-		C
Coniothyrium minitans bio	fungicida	-	-**	C	Olio minerale paraffinico bio	acar./coadiuv./insett.	20	0,01*	C
COS-OGA bio (4)	elicitore	0		C	Oxamil	nematocida	21	0,01*	C
Cyantraniliprole	insetticida	14	0,4	C	P-nitrofenalato di sodio	fitoregolatore	3	0,03	C
Cyazofamid	fungicida	3	0,2	C	Paecilomyces lilacinus cp 251 bio	nematocida	-	-**	C
Cyprodinil	fungicida	3	0,5	C	Penconazolo	fungicida	3	0,06	C
Dazomet	dis./fung./ins./nem.	-	0,1	T.a.c.	Penthiopyrad	fungicida	3	0,7	C
Deltametrina (3)	insetticida	3	0,2	C	Piretrine bio	insetticida	1	1	C
Difenoconazolo	fungicida	3	0,3	C	Piretrine bio	insetticida	-	1	S
Dimetomorf	fungicida	3	0,5	C	Pirimicarb	insetticida	3	1	C
Ditiocarbammati	fungicida	3	2	C	Propamocarb	fungicida	3	5	C
Eamectina benzoato	insetticida	3	0,01*	C	Pseudomonas sp. Ceppo DMSZ 13134 bio	fungicida	1		C
Estratto d'aglio bio	ins./nem./repellente	-		C	Pyraclostrobin	fungicida	3	0,5	C
Exitiazox	acaricida	3	0,5	C	Pyridaben (4)	acar. / insett.	3	0,15	C
Famoxadone	fungicida	3	0,2	C	Pyrimethanil (4)	fungicida	3	0,8	C
Fenamifos (5)	nematocida	60	0,02*	C	Pyriproxyfen	insetticida	3	0,1	C
Fenbuconazolo	fungicida	3	0,2	C	Pythium oligandrum bio (10)	fungicida	-		C
Fenhexamide	fungicida	3	1	C	Rame (composti del) bio	fungicida	3	5	C
Fenpirazamina (4)	fungicida	3	0,7	C	Sali di potassio di ac. grassi bio	acar. / insett.	0	-**	C
Fenpiroximate	acaricida	14	0,08	C	Spinetoram	insetticida	3	0,2	C
Flonicamid	insetticida	3	0,5	C	Spinosad bio	insetticida	3	0,3	C
Fluazifop-p-butile	diserbante	30	0,03	C	Spiromesifen (4)	acar. / insett.	3	0,3	C
Fludioxonil	fungicida	3	0,4	C	Spirotetrammato	acar. / insett.	3	0,2	C
Fluopicolide	fungicida	3	0,5	C					

° in pieno campo; °° in coltura protetta

Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso	Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso
Streptomyces k61 <i>bio</i> (6)	fungicida	-	-**	C	Trichoderma atroviride cp T11 <i>bio</i>	fungicida	3	-**	C
Streptomyces k61 <i>bio</i> (6)	fungicida	-	-**	S	Trichoderma gamsii <i>bio</i>	fungicida	-	-**	C
Sulfoxaflor	insetticida	1	0,5	C	Trichoderma harzianum <i>bio</i>	fungicida	-	-**	C
Tau-fluvalinate (10)	acar. / insett.	7	0,05	C	Trifloxystrobin	fungicida	3	0,3	C
Tebuconazolo	fungicida	3	0,6	C	1,3 dicloropropene ()	nematocida	-	0,01*	
Tebufenpirad	acaricida	3	0,3	C	Zeta-cipermetrina (2)	insetticida	3	0,2	C
Teflutrin	insetticida	-	0,05	C	(Z,E)-9,11-tetradecadien-1-il acetato <i>bio</i>	feromone	-		C
Terpenoid blend QRD-460 (4)	acar. / insett.	-		C	(Z,E)-9,12-tetradecadien-1-il acetato <i>bio</i>	feromone	-		C
Tetraconazolo	fungicida	3	0,2	C	Zolfo <i>bio</i>	fungicida	3	-**	C
Thiacloprid (11)	insetticida	3	0,5	C	Zoxamide	fungicida	3	2	C
Trichoderma asperellum <i>bio</i>	fungicida	-	-**	C					

LEGENDA

bio = uso consentito in agricoltura biologica

IdS = Intervallo di sicurezza in gg

LMR = Limite massimo di Residuo (Reg. CE 396/2005)

*= limite inferiore di rilevanza analitica

**= esente da indicazione

C: coltura

D: derrata

T.a.c.: terreno in assenza di coltura

S: semente

(1) Come nematocida uso esclusivo in serra con il sistema di irrigazione a goccia o con manichette

(2) Applicazione anche su colture portaseme destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme)

(3) Applicazione anche in vivaio

(4) Utilizzo solo in serra.

(5) Solo applicazione per irrigazione a goccia in serre con struttura permanente

(6) Applicazione anche in semenzaio

(7) Applicazione al terreno con impianti a goccia o con distribuzione localizzata

(8) Utilizzo solo in serre permanenti. La coltura così ottenuta deve rimanere all'interno di una serra permanente durante il suo ciclo di vita completo

(9) Impiego in ambiente protetto (serra o tunnel)

(10) Impiego per fertirrigazione

(11) Sostanza attiva revocata. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari è consentito fino al 3 febbraio 2021

Dati tratti da: BDF banca dati fitofarmaci di BDF srl Milano www.bdfsrl.it

NOTA: Riguardo la corretta modalità di impiego, variabile per ciascun prodotto fitosanitario e le specifiche utilizzazioni (es. divieto di impiego in serra, impiego solo al terreno, in post fioritura, ecc.) si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nell'etichetta del formulato commerciale poichè solo così si ha la certezza di operare correttamente. La presente scheda ha esclusivamente finalità divulgative. Tenuto conto della continua evoluzione della legislazione sui prodotti fitosanitari non si escludono imprecisioni ed omissioni la cui segnalazione sarà gradita.