



Sostanze attive autorizzate per l'impiego in agricoltura su:

PERO

Aggiornamento del 12 gennaio 2021

Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso	Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso
Abamectina (1)	acar./insett./nem.	3	0,03*	C	Fenpiroximate	acaricida	28	0,3	C
Acequinocil	acaricida	30	0,1	C	Flonicamid	insetticida	21	0,3	C
Acetamiprid	insetticida	14	0,4	C	Fluazifop-p-butile	diserbante	30	0,01*	C
Acibenzolar-S-metile	vario	14	0,2	C	Fluazinam	fungicida	63	0,3	C
Acido gibberellico	fitoregolatore	20		C	Fludioxonil	fungicida	3	5	C
Acido pelargonico	diserbante	-		C	Fludioxonil	fungicida	-	5	D
Acrinatrina (2)	acar./insett.	14	0,02*	C	Fluopyram	fungic./nemat.	14	0,5	C
Adoxophyes orana granulovirus bio	insetticida	3	-**	C	Flupyradifurone (1)	insetticida	14	0,4	C
Alfa-cipermetrina	insetticida	7	1	C	Flutriafol	fungicida	21	0,4	C
Aureobasidium pullulans bio	fungicida	-		C	Fluxapyroxad	fungicida	35	0,9	C
Azadiractina bio (1)	insetticida	3	1	C	Fosetil alluminio (1)	fungicida	15	150	C
Bacillus amyloliquefaciens sbs. plantarum bio	fungicida	-	-**	C	Fosfato ferrico bio (1)	limacida	-	-**	C
Bacillus subtilis bio	fungicida	3	-**	C	Fosfonati di potassio	fungicida	28	150	C
Bacillus T. sub. Aizawai bio (1)	insetticida	3	-**	C	Fosmet	insetticida	21	0,5	C
Bacillus T. sub. Kurstaki bio (1)	insetticida	3	-**	C	Gibberelline A4 e A7 (1)	fitoregolatore	-	-**	C
Beauveria bassiana bio	acar./insett.	-	-**	C	Glifosate (1)	diserbante	7	0,1*	C
Beta-ciflutrin (3)	insetticida	7	0,2	C	Grasso di pecora bio	repellente	-	-**	C
Bicarbonato di potassio bio	fungic./insettic.	1		C	Indoxacarb	insetticida	7	0,5	C
Bifenazato	acaricida	14	0,7	C	Isopirrazam	fungicida	21	0,7	C
Boscalid	fungicida	7	1,5	C	Isoxaben	diserbante	-	0,05	C
Captano	fungicida	21	10	C	Kresoxim-metil	fungicida	28	0,2	C
Carfentrazone-ethyl (1)	diserbante	7	0,01*	C	Lambda-cialotrina (1)	insetticida	7	0,08	C
Cicloxidim	diserbante	28	0,1	C	Laminarin bio	stimolatore difese	5	0,08	C
Cipermetrina (1)	insetticida	14	1	C	Mancozeb (1)	fungicida	28	5	C
Ciproconazolo	fungicida	7	0,1	C	MCPA	diserb./fitoreg.	15	0,05*	C
Clofentezine	acaricida	35	0,5	C	Metaldeide (1) (5)	limacida	20	0,05*	C
Clorantprilipolo	insetticida	14	0,5	C	Metam-potassio (1)	dis./fung./insett./nem.	-	0,02*	T.a.c.
Coniothyrium minitans bio	fungicida	-	-**	C	Metam-sodio (1)	dis./fung./insett./nem.	-	0,02*	T.a.c.
Cydia pomonella granulovirus bio	insetticida	1	-**	C	Metamitron	diserb./ fitoreg.	60	0,1*	C
Cyflumetofen	acaricida	7	0,4	C	Metiram	fungicida	21	5	C
Cyprodinil	fungicida	3	2	C	Metossifenozide	insetticida	14	2	C
2,4-D	diserbante	30	0,05*	C	Metribuzin	diserbante	14	0,1	C
Dazomet	Dis./Fung./Insett	-	0,02*	T.a.c.	Miclobutanil	fungicida	14	0,6	C
Deltametrina (1)	insetticida	3	0,1	C	NAA	fitoregolatore	5	0,15	C
Dicamba	diserbante	30	0,05*	C	NAD	fitoregolatore	30	0,15	C
Difenoconazolo	fungicida	14	0,8	C	Olio di arancio bio	acar./fungic./insett.	3		C
Diffenican	diserbante	14	0,01*	C	Olio di chiodi di garofano bio	fungic./nematoc.	-		D
Ditranon	fungicida	35	3	C	Olio di colza	acar./coadiuv./insett.	-		C
Ditiocarbammati	fungicida	21	5	C	Olio minerale paraffinico bio	acar./coadiuv./insett.	1	0,01*	C
Diuron	diserbante	60	0,01*	C	Orizalin (1) (6)	diserbante	-	0,01*	C
Dodecan-1-olo bio (4)	misc. feromonica	-	-**	C	Oxifluorfen	diserbante	-	0,1	C
Dodina	fungicida	40	0,9	C	Paclobutrazol	fitoregolatore	60	0,5	C
(E)-8-dodecen-1-il acetato bio (4)	feromone	-	-**	C	Paecilomyces lilacinus bio	nematocida	-	-**	C
(E,E) - 8,10 dodecadien-1- olo bio (4)	feromone	-	-**	C	Penconazolo	fungicida	14	0,15	C
(E,Z)-2,13-ottadecadien-1-il acetato bio (4)	feromone	-	-**	C	Pendimetanil	diserb./fitoregol.	-	0,05*	C
(E,Z)-3,13-ottadecadienyl acetato bio (4)	feromone	-	-**	C	Penthiopyrad	fungicida	21	0,5	C
(E,Z)-8-dodecen-il acetato bio (4)	feromone	-	-**	C	Piretrine bio	insetticida	1	1	C
Emamectina benzoato	insetticida	7	0,02	C	Piretrine bio	insetticida	2	1	D
Esfenvalerate	insetticida	14	0,1	C	Pirimicarb	insetticida	7	0,5	C
Etofenprox (1)	insetticida	7	0,7	C	Polisolfuro di calcio bio (1)	fung./ insett.	30		C
Etiozolo	acaricidi	28	0,07	C	Proesadione	fitoregolatore	55	0,1	C
Exitiazox	acaricida	28	1	C	Propaquizafop (1)	diserbante	30	0,02*	C
Fenbuconazolo	fungicida	28	0,5	C	Propizamide (1)	diserbante	-	0,02*	C
					Proteine idrolizzate bio	sost. Attrattiva	-		C
					Pyraclostrobin	fungicida	7	0,5	C
					Pyraflufen ethyl	diserbante	-	0,02*	C

Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso	Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso
Pyridaben	acaric./insett.	14	0,9	C	Thiacloprid (8)	insetticida	14	0,3	C
Pyrimetanil	fungicida	3	15	C	Tiabendazolo	fungicida	30	4	D
Pyrimetanil	fungicida	-	15	D	Tiofanato metile	fungicida	7	0,5	C
Pyriproxifen (7)	insetticida	-	0,2	C	Trichoderma asperellum <i>bio</i>	fungicida	-		C
Quizalofop-P-etile	diserbante	30	0,02*	C	Trichoderma atroviride cp T11 <i>bio</i>	fungicida	3		C
Rame (composti del) <i>bio</i>	fungicida	7	5	C	Trichoderma gamsii <i>bio</i>	fungicida	-		C
6-Benziladenina <i>bio</i> (1)	fitoregolatore	90	-**	C	Tricopir	diserb./fitoreg.	21	0,05	C
Sali di Potassio degli ac. grassi <i>bio</i>	insetticida	0		C	Trifloxistrobin	fungicida	14	0,7	C
Spinetoram	insetticida	7	0,2	C	Triflumuron	insetticida	28	0,5	C
Spinosad <i>bio</i> (1)	insetticida	7	0,3	C	1-metilciclopropene	fitoregolatore	-	0,01	C
Spirotetrammato	acar./insett.	21	1	C	(Z)-11-tetradecen-1-il acetato <i>bio</i>	feromone	-		C
Sulfoxaflor	insetticida	7	0,4	C	(Z)-8-dodecen-il acetato <i>bio</i>	feromone	-		C
Tau-fluvalinate (1)	acar./insett.	30	0,3	C	(Z)-8-dodecen-1-olo <i>bio</i>	feromone	-	-**	C
Tebuconazolo	fungicida	14	0,3	C	(Z)-9-tetradecenil acetato <i>bio</i>	feromone	-	1	C
Tebufenazide	insetticida	14	1	C	Zeta- cipermetrina (1)	insetticida	14	1	C
Tefubenzpirad (1)	acaricida	7	0,3	C	Ziram	fungicida	60	1	C
Tetraconazolo	fungicida	14	0,3	C	Zolfo	acar./funcic.	3		C
Tetradecan-1-olo <i>bio</i> (4)	feromone	-		C					

LEGENDA

bio = uso consentito in agricoltura biologica

IdS = Intervallo di sicurezza in gg.

LMR = Limite massimo di Residuo in p.p.m. (reg. CE 396/2005)

C: coltura

D: derrata

T.a.c.: Terreno in assenza di coltura

* = limite inferiore di rilevabilità analitica

**= esente da indicazione

(1) Applicazione anche in vivaio

(2) sospendere i trattamenti entro la fase fenologica di caduta petali BBCH 67-69

(3) Sostanza attiva revocata. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati è consentito fino al 20 luglio 2021.

(4) Applicazione mediante diffusori sui rami

(5) Solo applicazione al terreno sotto forma di esca.

(6) Anche impianti non in produzione

(7) Trattamento prima della fioritura

(8) Sostanza attiva revocata. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati è consentito fino al 3 febbraio 2021.

Dati tratti da: BDF banca dati fitofarmaci di BDF srl Milano www.bdfsrl.it

NOTA: Riguardo la corretta modalità di impiego, variabile per ciascun prodotto fitosanitario e le specifiche utilizzazioni (es. divieto di impiego in serra, impiego solo al terreno, in post fioritura, ecc.) si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nell'etichetta del formulato commerciale poiché solo così si ha la certezza di operare correttamente. La presente scheda ha esclusivamente finalità divulgative. Tenuto conto della continua evoluzione della legislazione sui prodotti fitosanitari non si escludono imprecisioni ed omissioni la cui segnalazione sarà gradita.