



Sostanze attive autorizzate per l'impiego in agricoltura:

CARCIOFO

Aggiornato al 04 dicembre 2020

Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso	Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso
Acetamiprid	insetticida	7	0,7	C	Metaldeide (1)	limacida	20	0,07	C
Acido gibberellico	fitoregolatore	15	-*	C	Metam-potassio (1) (3)	dis./fung./ins./nem.	-	0,02*	T.a.c.
Acido pelargonico	diserbante	-	-	C	Metam-sodio (1)	dis./fung./ins./nem.	-	0,02*	T.a.c.
Aclonifen	diserbante	-	0,02**	C	Metazachlor	diserbante	-	0,06*	C
Alfa-cipermetrina	insetticida	7	2	C	Miclobutanil	fungicida	3	0,5	C
Azoxystrobin	fungicida	7	5	C	NAA	fitoregolatore	7	0,06**	C
Bacillus T. sub. Aizawai <i>bio</i> (1)	insetticida	3	-*	C	Olio di colza	acar./coadiuv./insettic.	-	-	C
Bacillus T. sub. Kurstaki <i>bio</i> (1)	insetticida	-/3	-*	C	Olio minerale paraffinico <i>bio</i>	acar./coadiuv./insettic.	20	0,01*	C
Bicarbonato di potassio <i>bio</i>	fungicida	1	-	C	Oxifluorfen	diserbante	-	0,05**	C
Boscalid	fungicida	3	5	C	Paecilomyces lilacinus cp. 251 <i>bio</i>	nematocida	-	-*	C
Cimoxanil	fungicida	14	0,01*	C	Pencicuron	fungicida	-	0,05**	S
Cipermetrina	insetticida	3	2	C	Penconazolo	fungicida	14	0,06	C
Ciproconazolo	fungicida	14	0,1	C	Pendimetalin	diserbante	60	0,05**	C
Cletodim	diserbante	40	0,5	C	Piretrine <i>bio</i>	insetticida	2	1	C
Cloranttriliprilo	insetticida	3	2	C	Piretrine <i>bio</i>	insetticida	-	1	S
Coniothyrium minitans <i>bio</i>	fungicida	-	-*	C	Piridate	diserbante	42	0,05**	C
Dazomet	dis./fung./ins./nem.	-	0,02*	T.a.c.	Pirimicarb	insetticida	7	5	C
Deltametrina (1)	insetticida	3	0,2	C	Propizamide	diserbante	-	0,02	C
Difenoconazolo	fungicida	7	1,5	C	Pyraclostrobin	fungicida	3	3	C
Dimetomorf	fungicida	3	2	C	Pyraflufen ethyl	diserbante	-	0,02**	C
Emamectina benzoato	insetticida	3	0,1	C	Quizalofop etile isomero D	diserbante	30	0,01**	C
Fluazifop-p-butile	diserbante	30	0,9	C	Quizalofop-p-etile (1)	diserbante	30	0,01**	C
Fluopyram (2)	fung./nematoc.	7	0,5	C	Rame (composti del) <i>bio</i>	fungicida	3	20	C
Flutolanil	fungicida	-	0,01**	C	Spinosad <i>bio</i>	insetticida	3	0,15	C
Fluxapyroxad	fungicida	7	0,3	C	Spirotetrammato	acar./insett.	7	1	C
Fosetil alluminio	fungicida	15	50	C	Tau-fluvalinate (1)	acar./insett.	7	0,8	C
Fosfato ferrico <i>bio</i> (1)	limacida	-	-	C	Tebuconazolo	fungicida	3	0,6	C
Glifosate	diserbante	21	0,1**	C	Terpenoid blend QRD-460	acar./insett.	-	-	C
Glifosate	diserbante	-	0,1**	T.a.c.	Tetraconazolo	fungicida	7	0,2	C
Indoxacarb	insetticida	10	0,2	C	Trichoderma asperellum <i>bio</i>	fungicida	-	-	C
Lambda-cialotrina	insetticida	3	0,15	C	Trichoderma gamsii <i>bio</i>	fungicida	-	-	C
Maltodestrina <i>bio</i>	acar./insett.	-	-	C	(Z,E)-9,11-teradecadien-1-il acetato <i>bio</i>	feromone	-	-	C
Metalaxil	fungicida	20	0,05	C	(Z,E)-9,12-teradecadien-1-il acetato <i>bio</i>	feromone	-	-	C
Metalaxil- M (1)	fungicida	20	0,05	C	Zolfo <i>bio</i>	acar./fung.	3	-	C

LEGENDA

bio = uso consentito in agricoltura biologica

IdS = Intervallo di sicurezza

LMR = Limite massimo di Residuo in p.p.m. (reg. CE 396/2005)

* = esente da indicazione

** = limite inferiore di rilevanza analitica

(1) Applicazione anche in vivaio

(2) Utilizzo in campo

(3) Applicazione anche in semenzaio

C: coltura

D: derrata

T.a.c.: Terreno in assenza di coltura

S: semente

Dati tratti da: BDF banca dati fitofarmaci di BDF srl Milano

www.bdfsrl.it

NOTA: Riguardo la corretta modalità di impiego, variabile per ciascun prodotto fitosanitario e le specifiche utilizzazioni (es. divieto di impiego in serra, impiego solo al terreno, in post fioritura, ecc.) si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nell'etichetta del formulato commerciale poiché solo così si ha la certezza di operare correttamente. La presente scheda ha esclusivamente finalità divulgative. Tenuto conto della continua evoluzione della legislazione sui prodotti fitosanitari non si escludono imprecisioni ed omissioni la cui segnalazione sarà gradita.