



LATTUGA

Aggiornamento al 23 novembre 2020

Sostanze attive autorizzate per l'impiego in agricoltura:

Sostanza attiva	Impiego	IdS	LMR	Uso	Sostanza attiva	Impiego	IdS	LMR	Uso
Abamectina	acar./insett./nem.	7	0,09	C	Glifosate	diserbante	-	0,1*	T.a.c.
Acetamiprid	insetticida	3	1,5	C	Helicoverpa armigera nucleopoliedrovirus bio	insetticida	3		C
Acibenzolar-s-metile	attivatore difese	3/14°	0,4	C	Indoxacarb	insetticida	3	3	C
Acido gibberellico	fitoregolatore	20		C	Lambda-cialotrina	insetticida	-/14	0,15	C
Acido pelargonico	diserbante	-	-*	C	Laminarin bio	stimolatore difese	-		C
Alfa-cipermetrina	insetticida	3	2	C	Lecanicillium muscarium bio (7)	insetticida	3		C
Ametoctradin	fungicida	7	40	C	Maltodestrina	acar./insett.	-		C
Amisulbrom	fungicida	3	4	C	Mancozeb	fungicida	21	5	C
Azadiractina bio (1)	insetticida	3	1	C	Mandipropamid	fungicida	7	25	C
Azoxystrobin	fungicida	7	15	C	Metaflumizone (5)	insetticida	7	5	C
Bacillus amyloliquefaciens FZB24 bio (2)	fungicida	0		C	Metalaxil	fungicida	15	3	C
Bacillus amyloliquefaciens MBI600 bio	fungicida	-		C	Metalaxil- M (1)	fungicida	10	3	C
Bacillus amyloliquefaciens sbs. Plantarum bio	fungicida	-	-*	C	Metaldeide (1)	limacida	20	2	C
Bacillus subtilis bio	fungicida	-/3	-*	C	Metam-potassio (1)	dis./fung./ins./nem.	-	0,02*	T.a.c.
Bacillus T. sub. Aizawai bio (1)	insetticida	3	-*	C	Metam-sodio (1)	dis./fung./ins./nem.	-	0,02*	T.a.c.
Bacillus T. sub. Kurstaki bio (1)	insetticida	3	-*	C	Metiram	fungicida	7	5	C
Beauveria bassiana bio	acar./insett.	-	-*	C	Metossifenozide	insetticida	3	4	C
Benfluralin	diserbante	-	0,02**	C	Olio di arancio bio	acar./fungic./insett.	3		C
Boscalid	fungicida	14	50	C	Olio di colza	acar./coadiuv./insett.	-		C
Cerevisane bio	induttore di resist.	-		C	Oxathiapiprolin	fungicida	7	0,3	
Cicloxdim	diserbante	21	1,5	C	Paecilomyces lilacinus cp 251 bio	nematocida	-	-*	C
Cimoxanil	fungicida	7	0,03	C	Pendimetanil	diserb./fitoreg.	30	4	C
Cipermetrina	insetticida	3	2	C	Penthiopyrad	fungicida	7	15	C
Clorantraniliprololo	insetticida	3	20	C	Piretrine bio	insetticida	1	1	C
Coniothyrium minitans bio	fungicida	-	-*	C	Piretrine bio	insetticida	-	1	S
COS-OGA bio (3)	elicatore difese	0		C	Pirimicarb	insetticida	7	1,5	C
Cyantraniliprole	insetticida	3/14°	5	C	Propamocarb	fungicida	7	40	C
Cyprodinil	fungicida	7	15	C	Propaquizafop	diserbante	15	0,2	C
Dazomet	dis./fung./ins./nem.	-	0,03	T.a.c.	Propizamide	diserbante	30	0,6	C
Deltametrina (1)	insetticida	3	0,5	C	Pseudomonas sp. Ceppo DSMZ 13134 bio	fungicida	1		C
Difeconazolo	fungicida	7	4	C	Pyraclostrobin	fungicida	14	2	C
Dimetomorf	fungicida	3	15	C	Pyrimethanil	fungicida	14	20	C
Ditiocarbammati	fungicida	7	5	C	Pythium oligandrum bio (8)	fungicida	-		C
Emamectina benzoato	insetticida	3	1	C	Quizalofop-p-etile	diserbante	28	0,2	C
Esfenvalerate	insetticida	9	0,2	C	Rame (composti del) bio	fungicida	3	100	C
Estratto d'aglio bio	insett./nemat./varic	-		C	Sali di potassio degli ac. grassi bio	acar./insetticida	0		C
Etofenprox (1)	insetticida	7	3	C	Spinetoram	insetticida	3	10	C
Fenexamide (4)	fungicida	3	50	C	Spinosad	insetticida	3	10	C
Fluazifop-p-butile	diserbante	30	0,02	C	Spirotetrammato (4)	acar./insetticida	7	7	C
Fludioxonil	fungicida	7	40	C	Spodoptera littoralis nucleopoliedrovirus bio	insetticida	3		C
Fluopicolide	fungicida	7/14°	9	C	Streptomyces K61 bio	fungicida	-		C
Fluopyram (5)	fung./nemat.	7	15	C	Streptomyces K61 bio	fungicida	-		S
Flupyradifurone	insetticida	3	5	C	Sulfoxaflor	insetticida	7	4	C
Fluxapyroxad	fungicida	14	4	C	Tau-fluvalinate (1)	acar./insett.	14	0,7	C
Folpet	fungicida	21	0,03**	C	Tebufenozide	insetticida	14	10	C
Formetanato (5)(6)	acar./insett.	-	0,01**	C	Teflutrin	insetticida	-	0,05	C
Fosetil alluminio	fungicida	14	300	C					
Fosfato ferrico bio (1)	limacida	-	-*	C					

° 3 per applicazioni fogliari in campo, 14 per applicazioni fogliari in serra e per applicazioni al suolo

°° 7 in campo, 14 in serra

Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso	Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso
Terpenoid blend QRD-460	acar./insett.	-		C	1,3 dicloropropene (10)	nematocida	-	0,01*	C
Trichoderma asperellum <i>bio</i>	fungicida	-	-*	C	(Z,E)-9,11-tetradecadien-1-il-acetato <i>bio</i>	feromone	-	-**	C
Trichoderma atroviride cp T11 <i>bio</i>	fungicida	3	-*	C	(Z,E)-9,12-tetradecadien-1-il-acetato <i>bio</i>	feromone	-	-**	C
Trichoderma gamsii <i>bio</i>	fungicida	-	-*	C	Zeta-cipermetrina	insetticida	7	2	C
Trichoderma harzianum <i>bio</i>	fungicida	-	-*	C	Zolfo	fungicida	5	-*	C
Trifloxystrobin	fungicida	7	15	C					

LEGENDA

bio = uso consentito in agricoltura biologica

IdS = Intervallo di sicurezza

LMR = Limite massimo di Residuo in p.p.m. (reg. CE 396/2005)

* = limite inferiore di rilevabilità analitica

**= esente da indicazione

C: coltura

D: derrata

T.a.c.: Terreno in assenza di coltura

S: semente

(1) Applicazione anche in vivaio

(2) Sospendere i trattamenti 4 ore prima della raccolta

(3) Il prodotto Ibisco ha ottenuto l'estensione di impiego su lattughe e simili per un periodo di 120 giorni fino al 2 marzo 2021

(4) In pieno campo e in serra

(5) Applicazione solo in campo

(6) Trattamento entro la fase di 4-6 foglie

(7) Impiego in ambiente protetto (serra o tunnel)

(8) Impiego per fertirrigazione

(9) Utilizzo solo in serra

(10) Autorizzazione straordinaria (reg. 1107/2009, art.53): su lattuga estensione di impiego per un periodo di 120 giorni dal 1 settembre 2020 al 1 gennaio 2021

su terreno in assenza di coltura e destinato alla semina

Dati tratti da: BDF banca dati fitofarmaci di BDF srl Milano www.bdfsrl.it

NOTA: Riguardo la corretta modalità di impiego, variabile per ciascun prodotto fitosanitario e le specifiche utilizzazioni (es. divieto di impiego in serra, impiego solo al terreno, in post fioritura, ecc.) si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nell'etichetta del formulato commerciale poichè solo così si ha la certezza di operare correttamente. La presente scheda ha esclusivamente finalità divulgative. Tenuto conto della continua evoluzione della legislazione sui prodotti fitosanitari non si escludono imprecisioni ed omissioni la cui segnalazione sarà gradita.