



FRAGOLA

Aggiornamento al 01 dicembre 2020

Sostanze attive autorizzate per l'impiego in agricoltura:

Sostanza attiva	Tipologia	IdS	RML	Uso	Sostanza attiva	Tipologia	IdS	RML	Uso
Abamectina	acar./insett./nem.	3	0,15	C	Helicoverpa armigera nucleopoliedrovirus bio	insetticida	3		C
Acetamiprid	insetticida	3	0,5	C	Isofetamid	fungicida	1	4	C
Acido gibberellico	fitoregolatore	20	-*	C	Lambda-cialotrina	insetticida	3	0,2	C
Acido pelargonico	diserbante	-	-*	C	Laminarin bio	stimolatore difesa	-	-*	C
Acrinatrina (1)	acar./insett.	-	0,02**	C	Lecanicillium muscarium bio (8)	insetticida	3	-*	C
Ampelomyces quisqualis bio	fungicida	-	-*	C	MCPA	fitoregolatore	20	0,05**	C
Aureobasidium pullulans bio	fungicida	-	-*	C	Mepanipyrim	fungicida	3	3	C
Azadiractina bio (2)	insetticida	3	1	C	Meptyldinocap	fungicida	3	3	C
Azoxystrobin	insetticida	3	10	C	Metalaxil	fungicida	40	0,6	C
Bacillus amyloliquefaciens FZB24 bio (3)	fungicida	0	-*	C	Metalaxil- M	fungicida	40	0,6	C
Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 bio	fungicida	-	-*	C	Metaldeide (2)	limacida	20	0,05**	C
Bacillus amyloliquefaciens sbs. Plantarum bio	fungicida	-	-*	-*	Metam-potassio (2) (9)	dis./fung./insett./nem.	-	0,02*	T.a.c.
Bacillus pumilus QST 2808 bio	fungicida	-	-*	C	Metam-sodium (2)	dis./fung./insett./nem.	-	0,02*	T.a.c.
Bacillus subtilis bio	fungicida	3	-*	C	Metarhizium anisopliae var. anisoplae bio	acar./insett.	3	-*	C
Bacillus T. sub. Aizawai bio (2)	insetticida	-	-*	C	Miclobutanil	fungicida	3/7	1	C
Bacillus T. sub. Kurstaki bio (2)	insetticida	3	-*	C	Milbemectina	acaricida	3	0,02**	C
Beauveria bassiana bio	acaric./insett.	-	-*	C	NAA (9) 10)	fitoregolatore	7	0,06**	C
Bicarbonato di potassio bio	fungic./insett.	1	-*	C	NAD	fitoregolatore	7	0,06**	C
Bifenazato	acaricida	3	3	C	Olio di arancio bio	acar./fungic./insett.	3		C
Boscalid	fungicida	3	6	C	Paecilomyces lilacinus cp 251 bio	nematocida	-	-*	C
Bupirimate	fungicida	3	2	C	Pencicuron	fungicida	-	0,05**	S
Captano	fungicida	14	1,5	C	Penconazolo	fungicida	3	0,5	C
Cerevisane bio	induttore resistenza	-	-*	C	Pendimetanil	diserbante	-	0,05**	C
Ciflufenamid	fungicida	3	0,04	C	Penthiopyrad	fungicida	3	3	C
Clofentezine	acaricida	3	2	C	Piretrine bio	insetticida	2	1	C
Clorantprilprolo	insetticida	3	1	C	Piretrine bio	insetticida	2	1	D
Coniothyrium minitans bio	fungicida	-	-*	C	Pirimicarb	insetticida	7	1,5	C
Cyflumetofen (4)	acaricida	1	0,6	C	Pseudomonas sp. Ceppo DSMZ 13134 bio	fungicida	1		C
Cyprodinil	fungicida	1	5	C	Pyraclostrobin	fungicida	3	1,5	C
Dazomet	dis./fung./insett./nem.	-	0,02*	T.a.c.	Pyridaben (6)	acaric./insetticida	7	0,9	C
Deltametrina (2)	insetticida	3	0,2	C	Pyrimethanil	fungicida	3	5	C
Difenoconazolo	fungicida	1	2	C	Pythium oligandrum bio	fungicida	-		C
Emamectina benzoato	insetticida	3	0,05	C	Quizalofop-p-etile isomero D	diserbante	30	0,02**	C
Etoxazole	acaricida	3	0,2	C	Quizalofop-p-etile	diserbante	42	0,02**	C
Exitiazox	acaricida	3	0,5	C	Rame (composti del) bio	fungicida	3	5	C
Fenexamide (5)	fungicida	3	10	C	Sali di Potassio degli ac. grassi bio	acar./insett.	0		C
Fenpirazamina (5)	fungicida	3	3	C	Spinetoram	insetticida	3	0,2	C
Fenpiroximate	acaricida	7	0,3	C	Spinosad (5) bio	insetticida	3	0,3	C
Fludioxonil	fungicida	1	4	C	Spiromesifen (11)	acar./insett.	3	1	C
Flupyradifurone (6)	insetticida	3	0,4	C	Spirotetramato	acar./insett.	-		C
Flutriafol	fungicida	3	1,5	C	Spodoptera littoralis nucleopoliedrovirus bio	insetticida	3		C
Fluxapyroxad	fungicida	1	4	C	Tau-fluvalinate (2)	acar./insett.	7	0,5	0,5
Formetanato (7)	insetticida	10	0,4	C	Tebufenpirad	acaricida	14	1	1
Fosetil alluminio (2)	fungicida	14	100	C	Terpenoid blend QRD-460	acar./insett.	-	-*	C
Fosfato ferrico bio (2)	limacida	-	-*	C	Tetraconazolo	fungicida	1	0,2	C
Glifosate	diserbante	7	0,1**	C					
Glifosate	diserbante	-	0,1**	T.a.c.					

Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso	Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso
Trichoderma asperellum <i>bio</i>	fungicida	-	-*	C	Trichoderma harzianum <i>bio</i>	fungicida	-	-*	C
Trichoderma atroviride cp T11 <i>bio</i>	fungicida	3	-*	C	Trifloxistrobin	fungicida	3	1	C
Trichoderma gamsii <i>bio</i>	fungicida	-	-*	C	Zolfo <i>bio</i>	fungicida	3	-*	C

LEGENDA

IdS = Intervallo di sicurezza in gg

LMR = Limite Massimo di Residuo in ppm (Reg. 396/2005)

bio = uso consentito in agricoltura biologica

C: coltura

D: derrata

T.a.c.: Terreno in assenza di coltura

S: semente

*= esente da indicazione

* *= limite inferiore di rilevabilità analitica

- (1) sospendere i trattamenti entro la fase fenologica di pre-fioritura BBCH 56
- (2) Applicazione anche in vivaio
- (3) Sospendere i trattamenti 4 ore prima della raccolta
- (4) Impiego in serra e tunnel
- (5) Applicazione in serra e pieno campo
- (6) Impiego solo in serra
- (7) Impiego solo in campo
- (8) Applicazione solo in ambiente protetto (serra o tunnel)
- (9) Applicazione anche in semenzaio
- (10) Applicazione per il diradamento in fase di fioritura e, in preraccolta, come anticascola in fase di caduta dei frutti
- (11) Applicazione solo in coltura protetta

Dati tratti da: BDF banca dati fitofarmaci di BDF srl Milano www.bdfsrl.it

NOTA: Riguardo la corretta modalità di impiego, variabile per ciascun prodotto fitosanitario e le specifiche utilizzazioni (es. divieto di impiego in serra, impiego solo al terreno, in post fioritura, ecc.) si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nell'etichetta del formulato commerciale poichè solo così si ha la certezza di operare correttamente. La presente scheda ha esclusivamente finalità divulgative. Tenuto conto della continua evoluzione della legislazione sui prodotti fitosanitari non si escludono imprecisioni ed omissioni la cui segnalazione sarà gradita.