



Sostanze attive autorizzate per l'impiego in agricoltura:

PATATA

Aggiornamento al 18 dicembre 2020

Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso	Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso
Acetamiprid	insetticida	7	0,01*	C	Fosfato ferrico <i>bio</i> (1)	limacida	-		C
Acido gibberellico	fitoregolatore	20		C	Fosmet	insetticida	14	0,05*	C
Acido pelargonico	diserbante	-		C	Fosthiazate (4)	nematocida	-	0,02*	C
Acclonifen	diserbante	-	0,02*	C	Glifosate (1)	diserbante	-	0,5	C
Alfa-cipermetrina	insetticida	7	0,05*	C	Glifosate (1)	diserbante	-	0,5	T.a.c.
Ametoctradin	fungicida	7	0,05	C	Idrazide maleica	fitoregolatore	21	60	C
Amisulbrom	fungicida	7	0,01*	C	Lambda-cialotrina	insetticida	3	0,01*	C
Azadiractina <i>bio</i> (1)	insett./nemat.	3	1	C	Maltodestrina	acar./insett.	-		C
Azoxystrobin (2)	fungicida	-	7	C	Mancozeb	fungicida	7	0,3	C
Bacillus amyloliquefaciens sbs plantarum <i>bio</i>	fungicida	-		C	Mandipropamid	fungicida	3	0,01*	C
Bacillus subtilis <i>bio</i>	fungicida	-		C	Metaflumizone	insetticida	14	0,05	C
Bacillus T. Aizawai <i>bio</i> (1)	insetticida	3		C	Metalaxil	fungicida	21	0,02*	C
Bacillus T. Kurstaki <i>bio</i> (1)	insetticida	-		C	Metalaxil- M	fungicida	14	0,02*	C
Beauveria bassiana <i>bio</i>	acaric./insetticida	-		C	Metaldeide (1)	limacida	7	0,15*	C
Benalaxil (3)	fungicida	7	0,05*	C	Metam-potassio (1)	dis./fung./ins./nem.	-	0,02*	T.a.c.
Benalaxil - m	fungicida	14	0,05*	C	Metam-sodium (1)	dis./fung./ins./nem.	-	0,02*	T.a.c.
Benthiavalcab	fungicida	7	0,02*	C	Metiram	fungicida	7	0,3	C
Beta-ciflutrin	insetticida	3	0,04	C	Metobromuron	diserbante	-		C
Carfentrazone-etile	diserbante	3	0,01*	C	Metribuzin	diserbante	60	0,1*	C
Cicloxidim	diserbante	56	3	C	NAA	fitoregolatore	20	0,06*	C
Cimoxanil	fungicida	3	0,01*	C	Napropamide	diserbante	-	0,1	C
Cipermetrina	insetticida	3	0,05*	C	Olio di colza	acar./coadiuv./insett.	-		C
Cletodim	diserbante	56	0,5	C	Olio di menta verde <i>bio</i>	fitoregolatore	3		D
Clomazone	diserbante	60	0,01*	C	Olio minerale paraffinico <i>bio</i>	acar./coadiuv./insett.	20	0,01*	C
Clorantniliprololo	insetticida	14	0,02	C	Oxamil	nematocida	-	0,01*	C
Coniothyrium minitans <i>bio</i>	fungicida	-	-**	C	Oxathiapiprolin	fungicida	3	0,01*	C
Cyazofamid	fungicida	7	0,01*	C	Paecilomyces lilacinus cp 251 <i>bio</i>	nematocida	-		C
Dazomet	dis./fung./ins./nem.	-	0,02*	T.a.c.	Pencicuron	fungicida	-	0,1	C
Deltametrina (1)	insetticida	7	0,3	C	Pencicuron	fungicida	-	0,1	S
Difenoconazolo	fungicida	3	0,1	C	Pendimetalin	diserb./fitoreg.	-	0,05*	C
Diflufenican	diserbante	-	0,01	C	Piperonil butossido	sinergizzante piretrine	14		C
Dimetomorf	fungicida	3	0,05	C	Piretrine <i>bio</i>	insetticida	1	1	C
Ditiocarbammati	fungicida	7	0,3	C	Piretrine <i>bio</i>	insetticida	-	1	S
Emamectina benzoato	insetticida	3	0,01*	C	Pirimicarb	insetticida	7	0,05	C
Esfenvalerate	insetticida	7	0,02*	C	Propamocarb	fungicida	7	0,3	C
Etofenprox (1)	insetticida	7	0,01*	C	Propaquizafop	diserbante	40	0,1	C
Famoxadone	fungicida	14	0,02	C	Prosulfocarb	diserbante	90	0,01*	C
Fluazifop-p-butile	diserbante	50	0,15	C	Pseudomonas sp cp DSMZ 13134 <i>bio</i>	fungicida	65		C
Fluazinam	fungicida	7	0,02	C	Pyraclostrobin	fungicida	3	0,02*	C
Flufenacet	diserbante	-	0,15	C	Pyraflufen etile	diserbante	-	0,02*	C
Flupicolide	fungicida	7	0,03	C	Quizalofop etile isomero D	diserbante	45	0,1	C
Fluopyram	fung./nemat.	-	0,15	C	Quizalofop-p-etile	diserbante	30	0,1	C
Flutolanil	fungicida	-	0,1	C	Rame (composti del) <i>bio</i>	fungicida	3	5	C
Flutolanil	fungicida	-	0,1	S	Rimsulfuron	diserbante	30	0,01*	C
Fluxapyroxad	fungicida	-	0,1	C	Spinosad <i>bio</i>	insetticida	7	0,02*	C
Fluxapyroxad	fungicida	-	0,1	S	Streptomyces k61 <i>bio</i>	fungicida	-		S
Fosetil alluminio	fungicida	20	40	C	Sulfoxaflo	insetticida	7	0,03	C
					Tau-fluvalinate (1)	acar./insett.	7	0,01*	C

Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso	Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso
Teflutrin	insetticida	-	0,01*	C	Valifenalate	fungicida	7	0,01*	C
Thiacloprid (5)	insetticida	14	0,02	C	(Z,E)-9,11-tetradecadien-1-il acetato <i>bio</i>	feromone	-		C
Tiabendazolo	fungicida	30	0,04	D	(Z,E)-9,12-tetradecadien-1-il acetato <i>bio</i>	feromone	-		C
Tolclofos-metile	fungicida	-	0,2	S	Zeta-cipermetrina	insetticida	14	0,05*	C
Trichoderma asperellum <i>bio</i>	fungicida	-	-**	C	Zolfo <i>bio</i>	acar./fungic.	5	-**	C
Trichoderma harzianum <i>bio</i>	fungicida	-	-**	C	Zoxamide	fungicida	7	0,02*	C

LEGENDA

bio = uso consentito in agricoltura biologica

IdS = Intervallo di sicurezza

LMR = Limite Massimo di Residuo

* = limite inferiore di rilevabilità analitica

**= esente da indicazione

C: coltura

D: derrata

S: semente

T.a.c.: Terreno in assenza di coltura

- (1) Applicazione anche in vivaio
- (2) Applicazione nei solchi di semina
- (3) Sostanza attiva revocata. Il suo utilizzo è consentito fino al 5 ottobre 2021
- (4) Solo applicazione con mezzi meccanici
- (5) Sostanza attiva revocata. Il suo utilizzo è consentito fino al 3 febbraio 2021

Dati tratti da BDF banca dati fitofarmaci di BDF srl Milano www.bdfsrl.it

NOTA: Riguardo la corretta modalità di impiego, variabile per ciascun prodotto fitosanitario e le specifiche utilizzazioni (es. divieto di impiego in serra, impiego solo al terreno, in post fioritura, ecc.) si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nell'etichetta del formulato commerciale poichè solo così si ha la certezza di operare correttamente. La presente scheda ha esclusivamente finalità divulgative. Tenuto conto della continua evoluzione della legislazione sui prodotti fitosanitari non si escludono imprecisioni ed omissioni la cui segnalazione sarà gradita.