

ATTENZIONE!

Laphygma frugiperda

Una minaccia per mais e molte altre colture



Larva su mais. - B.R. Wiseman - USDA/ARS, Tifton (US). EPPO Global Database, <https://gd.eppo.int>

Che cos'è

La *Laphygma frugiperda* (*Spodoptera frugiperda*- Lepidoptera: Noctuidae) è originario dell'America tropicale e subtropicale. È stato inavvertitamente introdotto in altri continenti (Africa, Asia, Oceania) dove si è rapidamente diffuso e ha causato gravi perdite economiche al mais e ad altre colture alimentari. Nel 2019 è stato scoperto nella regione mediterranea in Egitto e nel 2020 in Israele e Giordania. Poiché la sua diffusione sta minacciando le colture di mais e molte altre piante, è importante rilevare questa specie invasiva e polifaga il prima possibile.

Danno larvale



Danni su mais
B.R. Wiseman - USDA/ARS, Tifton (US)



Larva su melanzana
Marja van der Straten, Dutch NPPO

Falena adulta



Femmina adulta
B.R. Wiseman - USDA/ARS, Tifton (US)

Contatti

Osservatorio per le Malattie delle Piante UO S4.04 - Via Sclafani, 30/34 – Acireale (CT) 95024
Tel. 095 894538 – e-mail: omp.acireale@regione.sicilia.it
Osservatorio per le Malattie delle Piante - UO S4.05 - - Via Uditore, 13/15 - 90145 Palermo -
Tel. 091 6859874/229019 - e-mail: omp.palermo@regione.sicilia.it



ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

SERVIZIO 4 FITOSANITARIO E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE



Questo poster è stato preparato in collaborazione con EPPO (www.eppo.int)

