


Figura 1 - Epoca di intervento contro la *Varrora* con le sostanze previste dal piano di controllo delle parassitosi nella regione SICILIA



(*) Apiguard può essere utilizzato durante il trattamento estivo anticipato, mentre Apilife Var e Thymovar sono prodotti ad azione prolungata da usare durante il trattamento estivo standard; è possibile abbinare apiguard o Apilife a trattamenti di sintesi. La barra **verde** indica il periodo in cui i formulati a base di timolo possono essere inseriti negli alveari.

(**) Apitraz, Apivar, Apistan e Polyvar sono sostanze ad azione prolungata da usare durante il trattamento estivo standard, eventualmente abbinati a trattamenti a base di timolo. La barra **rossa** indica il periodo in cui i prodotti di sintesi possono essere inseriti negli alveari.

(***) VARTERMINATOR, MAQS e APIFOR60 hanno un'azione di breve durata e possono essere usati durante il trattamento estivo anticipato o quello estivo standard. La barra **gialla** indica il periodo entro cui questi prodotti possono essere impiegati.

(****) Api-Bioxal e Oxyvar hanno un'azione di breve durata e vanno impiegati in blocco di covata (estivo e autunnale-invernale). La barra **blu** indica il periodo in cui l'acido ossalico può essere usato come singolo intervento.